

妊娠特定疾病		
序号	病种名称	疾病释义
1	侵蚀性葡萄胎	指异常增生的绒毛组织浸润性生长浸入子宫肌层或者转移至其他器官或者组织的葡萄胎，并已经进行化疗或者手术治疗的。
2	前置胎盘	指妊娠 28 周后，胎盘附着于子宫下段，下缘达到或覆盖宫颈内口，位置低于胎先露部。
3	胎盘早剥	指妊娠 20 周后或分娩期，正常位置的胎盘在胎儿娩出前，部分或全从子宫壁剥离。
4	母儿严重血型不合	指孕妇与胎儿之间因血型不合而产生的同种血型免疫性疾病，发生在胎儿期和新生儿早期，并满足下列条件之一： (1)ABO 血型不合：孕妇血清学检查，ABO 抗体效价在 1:512 以上； (2)Rh 血型不合：孕妇血清学检查，Rh 抗体效价在 1:32 以上。
5	前置血管	指附着在胎膜的脐带血管跨过宫颈内口，位于先露部前方。
6	宫外孕	指受精卵种植在子宫体腔以外部位的妊娠，其诊断必须经剖腹或腹腔镜检查证实，并已经手术而终止妊娠。

7	胎死腹中	指怀孕后胎儿在子宫内死亡。
8	未足月胎膜早破	指在妊娠 20 周以后、未满 37 周胎膜在临产前发生的胎膜破裂。
9	羊膜腔感染	<p>指在妊娠期病原微生物进入羊膜腔引起的感染,包括羊水感染、胎膜感染或胎盘感染,可引起孕产妇体温升高、脉率增快、胎心率增快等临床表现。并经腹羊膜腔穿刺检查,并满足下述条件方法之一</p> <p>1)羊水细菌培养:找到病原微生物;</p> <p>2)羊水涂片革兰染色检查:找到病原微生物;</p> <p>3) 羊水涂片计数白细胞:<math>\geq 30</math> 个白细胞/ml</p>
10	妊娠期糖尿病	<p>指妊娠 24 周后首次出现糖代谢异常,并满足下列标准:</p> <p>75 克糖 OGTT(口服葡萄糖耐量试验)诊断标准:空腹及服糖后 1、2 小时的血糖值分别为 5.1mmol/L、10.0mmo1/L、8.5mmol/L。任何一点血糖值达到或超过上述标准。</p>

11	子痫症	<p>又称“重度妊娠高血压综合症”，指血压持续高于 160mmHg/110mmHg、蛋白尿大于等于 5g/24h 或者尿常规中蛋白(++)-(++++)和(或者)伴水肿，有头痛等自觉症状，并且有抽搐或者昏迷。须经专科医生确诊，并提供同时具有下列条件中的至少两项的医学证明：</p> <p>(1)血肌酐升高(大于 1.6mg/dl)；</p> <p>(2)少尿(24 小时总尿量少于 500 毫升)；</p> <p>(3)出现神经系统的异常或者视力异常；</p> <p>(4)肺水肿；</p> <p>(5)黄疸进行性加重；</p> <p>(6)胎儿宫内死亡；</p> <p>(7)血小板减少，凝血症。</p>
12	无脐带综合征	指发育异常导致胎盘直接与胎儿腹壁相连，合并内脏外翻
13	脐带肿瘤	为脐带血管上皮肿瘤，可发生于脐带的任何部位，多发生于脐带的胎盘端，包括畸胎瘤、血管瘤、粘液瘤等。
14	妊娠期肝内胆汁淤积症	指妊娠期出现无诱因的皮肤瘙痒及血清总胆汁酸 > 10μmol/L。
15	妊娠期重度贫血	指孕产妇在妊娠后出现贫血，且外周血血红

		蛋白 $\leq$ 60g/L。
16	妊娠期急性脂肪肝	指妊娠期间内由于各种因素新发的肝脏细胞急性脂肪变性的一种疾病,主要临床特征包括明显的消化道症状、肝功能异常、凝血障碍,可导致急性肝衰竭。
17	围产期心肌病	指孕产妇在妊娠满 28 周后至产后 6 个月内发生的扩张性心肌病但同时满足下列条件: (1) 投保前无心血管系统疾病史; (2)上述妊娠期间出现心力衰竭但不能确定心力衰竭的确切原因
18	子宫破裂	指在妊娠晚期或分娩期子宫体部或子宫下段发生裂开,需尽快行手术治疗。先兆子宫破裂不在保障范围内。
19	子宫翻出	指分娩时以子宫内面翻出为特征的并发症。 包括下面二者之一: (1)部分翻出:宫底翻出于子宫下段及子宫颈口; (2) 完全翻出:子宫体部及下段完全翻出而暴露于阴道外
20	分娩并发膀胱破裂	指孕产妇分娩时出现膀胱破裂。分娩前及分娩后出现的膀胱破裂不在保障范围内。

21	产后出血并发休克	<p>指胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量过多，并满足下列所有指标:</p> <p>(1)24 小时内阴道流血量超过 500ml;</p> <p>(2)出现休克症状，如头晕、脸色苍白、脉搏细数、血压下降:</p> <p>(3)休克指 ( SI ) <math>\geq 1.5</math>。</p>
22	产褥感染	<p>指分娩及产褥期生殖道受病原体侵袭引起的局部或全身感染，以发热、疼痛、异常恶露为主要症状。</p>
23	羊水栓塞	<p>指在分娩过程中羊水突然进入母体血循环引起急性肺栓塞、过敏性休克、弥散性血管内凝血(DIC)、肾功能衰竭等一系列病理改变的严重分娩并发症。分娩过程中，出现下列不能用其他原因解释的情况之一，即可诊断：</p> <p>(1)血压骤降或心脏骤停；</p> <p>(2)急性缺氧或呼吸困难、发绀或呼吸停止；</p> <p>(3)凝血机制障碍，或无法解释的严重出血。</p>
24	弥漫性血管内凝血	<p>指因凝血功能障碍导致全身性出血不止及器官损伤，是一种妊娠所并发的致命性疾病，须经专科医生确诊，并提供同时具有下列条件中的至少三项的检验报告：</p>

		<p>(1)血小板计数 <math>&lt; 100 \times 10^9/L</math> 或者呈进行性下降；</p> <p>(2)血浆纤维蛋白原含量 <math>&lt; 1.5g/L</math> 或者 <math>&gt; 4g/L</math> 或者呈进行性下降；</p> <p>(3)3P 试验阳性或者血浆 FDP <math>&gt; 20mg/L</math>；</p> <p>(4)凝血酶原时间 <math>&gt; 15</math> 秒或者超过对照组 3 秒以上。</p>
25	妊娠剧吐合并韦尼克脑病(Wernicke 脑病)	<p>因妊娠剧吐导致维生素 B1 缺乏所引起的中枢神经系统综合征。本病须经专科医生确诊,并且排除酗酒、厌食症及消化系统疾病导致的维生素 B1 摄入不足或消耗增加。</p>
26	妊娠合并甲状腺功能亢进	<p>孕妇初次诊断甲状腺功能亢进,并且符合下列条件中至少一项：</p> <p>(1)基础代谢率 BMR 增高 <math>&gt; 40\%</math>；</p> <p>(2)静息状态心率 <math>&gt; 110</math> 次/分；</p> <p>(3)出现甲亢危象或心衰。</p>
27	妊娠合并病毒性肝炎	<p>本次妊娠期间孕妇初次诊断病毒性肝炎,实验室检测肝炎病毒呈阳性,并且符合下列条件中至少二项：</p> <p>(1)黄疸迅速加深,血清胆红素大于正常上限值的 5 倍；</p> <p>(2)ALT 和 AST 同时异常增高,至少一项</p>

		<p>大于正常上限值的 3 倍或二者均大于正常上限值的 2 倍；</p> <p>( 3 )凝血酶原活动度低于 40%并排除其它原因者；</p> <p>( 4 ) 出现肝性脑病。</p>
28	妊娠合并尿路感染	<p>本次妊娠期间孕妇初次罹患的尿道、膀胱、输尿管、肾盂部位的感染性炎症疾病，尿液培养病原体阳性，并且体温达到 39℃。</p>
29	妊娠合并急性阑尾炎	<p>本次孕期内孕妇初次诊断急性阑尾炎并且接受阑尾切除手术。</p>
30	妊娠合并急性肺炎	<p>本次妊娠期间孕妇初次诊断急性肺炎或急性支气管肺炎，并且符合下列条件中至少三项：</p> <p>( 1 ) 急性肺炎的影像学表现；</p> <p>( 2 ) 体温达到 39℃；</p> <p>( 3 ) 存在咳痰和肺部啰音；</p> <p>( 4 ) 痰培养病原体阳性。</p>